



## Kissenprimeli / *Primula vulgaris* / *Primula acaulis*

### Familie

Primulaceae / Primelgewächse

### Herkunft

Ganz Europa, bis Ukraine und Dänemark. Aus der Wildform entstanden durch Kreuzung zahlreiche Naturhybriden.

### Wuchs / Blüte

Kissenartig mit länglichen, eiförmigen Blättern. Blütezeit im Gewächshaus von Januar bis April, im Freiland von März bis Mai.

### Standort

Sonnig bis halbschattig, kühl, erträgt keinen Frost.

### Pflege

Mässig feucht halten, kalkarmes Wasser verwenden (Eisenmangel). Verwelkte Blüten inklusive Stiele ausbrechen. Nach der Blüte müssen die Pflanzen regelmässig gedüngt werden.

### Haltbarkeit

Blüht 2 Monate, unter schlechten Bedingungen, d.h. warm und wenig Licht, 2 Wochen.

### Kulturfehler

Vergilben der Blätter ist auf zuviel Wärme, Staunässe, zu niedrige Bodentemperaturen, Austrocknen des Ballens oder zu hohem Kalkgehalt (Giesswasser) zurückzuführen.

### Schädlinge und Krankheiten

Wenig anfällig, allenfalls Pilzkrankheiten bei zu hoher Luftfeuchtigkeit, Blattläuse und Raupen.

### Vermehrung

Durch Aussaat Anfang Juni (Lichtkeimer), Keimdauer 18 – 25 Tage.  
Optimale Keimtemperatur: 10°C , nach 10 Tagen bei 15°C bis 20°C.  
Pikieren nach 4 – 6 Wochen, Blüteninduktion bei 5°C.