



Kissenprimeli / *Primula vulgaris* / *Primula acaulis*

Familie

Primulaceae / Primelgewächse

Herkunft

Ganz Europa, bis Ukraine und Dänemark. Aus der Wildform entstanden durch Kreuzung zahlreiche Naturhybriden.

Wuchs / Blüte

Kissenartig mit länglichen, eiförmigen Blättern. Blütezeit im Gewächshaus von Januar bis April, im Freiland von März bis Mai.

Standort

Sonnig bis halbschattig, kühl, erträgt keinen Frost.

Pflege

Mässig feucht halten, kalkarmes Wasser verwenden (Eisenmangel). Verwelkte Blüten inklusive Stiele ausbrechen. Nach der Blüte müssen die Pflanzen regelmässig gedüngt werden.

Haltbarkeit

Blüht 2 Monate, unter schlechten Bedingungen, d.h. warm und wenig Licht, 2 Wochen.

Kulturfehler

Vergilben der Blätter ist auf zuviel Wärme, Staunässe, zu niedrige Bodentemperaturen, Austrocknen des Ballens oder zu hohem Kalkgehalt (Giesswasser) zurückzuführen.

Schädlinge und Krankheiten

Wenig anfällig, allenfalls Pilzkrankheiten bei zu hoher Luftfeuchtigkeit, Blattläuse und Raupen.

Vermehrung

Durch Aussaat Anfang Juni (Lichtkeimer), Keimdauer 18 – 25 Tage.
Optimale Keimtemperatur: 10°C, nach 10 Tagen bei 15°C bis 20°C.
Pikieren nach 4 – 6 Wochen, Blüteninduktion bei 5°C.

Weitere Pflegetipps unter www.huplant.ch